

嗨，女士們！

讓我們聊 聊梅毒

這是一種通過性行為
傳播的疾病在昆士蘭
有上升的趨勢。

關注性健康，詢問有關
梅毒的資訊。

LADYPEEPS.ORG.AU


#LadyPeeps
#AskAboutSyphilis
#TrueEducation



讓我們聊聊梅毒：

梅毒是一種無症狀可通過性行為傳播的感染 (STI)。如果不經過治療將會留在您的體內，並可傳遞給性伴侶，或孕期傳給未出生的嬰兒。

值得慶幸的是，梅毒很容易檢測、治療及治癒！




梅毒又回來了—您是陽性還是陰性？

幾個世紀以來梅毒是一種常見疾病，在許多國家梅毒幾乎已經根除，但現在全球包括澳洲，這種疾病再次增多。自 2013 年以來，昆士蘭州 15-29 歲年輕人以及男與男發生性關係的（也可能同時與女性發生性關係）的男性案例迅速增加。



等等，梅毒跟懷孕是怎麼回事？

患有梅毒的孕婦／人可能在不知情的情況下將其傳染給未出生的嬰兒（這稱為先天性梅毒）。懷孕期間的梅毒檢測很重要，因為可以在嬰兒出生之前就對感染進行治療，並且可以預防或盡可能減少對嬰兒的傷害。在懷孕的前 12 週進行梅毒檢測非常重要，因為未經治療的梅毒可在首次感染幾年後仍可將梅毒傳染給未出生的嬰兒。




您知道先天性梅毒是什麼嗎？

先天性梅毒可能造成嬰兒嚴重的致殘性感染並危及生命。受感染的嬰兒可能死於子宮（死產）或出生不久後死亡，或者可能早產，並由於梅毒感染而導致嚴重身體及神經異常。

等等!我不可能得梅毒, 為什麼要接受檢測?

不要聽信成見!如果您的性伴侶被感染,無論您有一個或多位性伴侶,曾經有過無保護的口交、陰道或肛門性交,任何人都可能罹患梅毒。



梅毒有什麼症狀?

跟所有 STI 一樣,可能有一些症狀或根本沒有任何症狀。梅毒有四個階段,如果您出現症狀,可能包括:

初級階段:

- 您可能會發現口腔、外陰、陰道、陰莖或肛門周圍有硬而無痛的瘡(這是感染進入身體的地方)。瘡也可能藏在其他難以看見的地方。而且由於通常無痛,您可能不會發現。感染後9-90天內可能出現在任何部位,無論是否接受治療都會自行消失。

第二階段:

- 此時,您可能會在身體、手掌或腳掌上出現紅色或紅褐色的皮疹。通常不會發癢,而且有時很輕微,以至於您幾乎沒有發現。您可能會感到噁心並出現類似流感的症狀,例如疲勞、輕度發燒、喉嚨痛、腺體腫脹、頭部及肌肉疼痛。您可能還會體重減輕及/或掉髮。這些症狀可能一次持續 2-6 個星期,並且可能時有時無持續長達兩年。同樣地—無論是否治療,症狀都會消失。

潛伏階段:

- 潛伏期是幾個月甚至幾年根本沒有任何體徵及症狀的時期,但是如果不能治療,您仍然患有梅毒。

第三階段:

- 三期梅毒非常嚴重,會在感染開始後 10 至 30 年發生。梅毒可影響體內許多不同的器官系統,包括血管、心臟、大腦及神經系統。這個疾病會損害您的內臟並可能導致死亡。

記住!

在早期階段，梅毒很容易治癒。後期仍然可以治癒並阻止對身體的進一步傷害，但是已造成的傷害無法修復或逆轉。

像梅毒這樣的 STI 是否值得羞愧? 不會!

不要讓羞恥感讓您停止控制性健康，因為控制性健康很容易。地球上大多數人都發生過性行為，所以不要讓任何人讓您感到羞恥或貶低您，只是因為您想要積極了解關於性健康。

檢測梅毒這類 STI 沒什麼大不了

是的，檢測比您想像的要容易，並且因為許多 STI 通常沒有症狀，所以檢測是100% 確定的唯一方法。


尷尬.....不!

當要求臨床醫生進行 STI 檢測時，不需要感到不舒服、尷尬或不好意思-這實際上是他們的職責，而且完全保密。另外，您當然不會是第一個(或最後一個)進去要求接受檢測的人，相信我，他們很清楚!

哪裡可以檢測梅毒?

請訪問以下網站。

www.stoptherise.initiatives.qld.gov.au



STI 檢測會是什麼樣



快速而簡單

部分 STI 檢測需要您的尿液，對於梅毒，則是快速血液檢查，或生殖器、口腔或喉嚨的拭子檢查。



保密

您的 STI 檢測結果完全保密，因此您不必擔心有人會發現，除非您想讓他們知道。

**FREE
FREE
FREE**


免費

昆士蘭州有很多免費診所，或者，您可以去看您的 GP 或到任何性健康診所進行檢測。



治療

大多數 STI 均可透過口服抗生素輕鬆治療，梅毒可透過注射青霉素治療。真的就這麼簡單。



為自己感到驕傲！

無論結果如何都要以自己為榮，STI 檢測不僅對您自己的健康很重要，而且還使您成為負責任的性伴侶。

那麼，如何降低罹患梅毒或其他 STI 的風險？

- 維持一夫一妻制關係，伴侶經過梅毒檢測確定沒有梅毒，雙方都沒有其他性伴侶。
- 總是使用避孕套和陰道及肛交的水性潤滑劑。
- 口交時總是使用口腔保護膜。
- 避免與生殖器、口腔或喉嚨有明顯潰瘍或瘡的人發生性關係（但請記住，您不可能總是發現！）。
- 定期進行 STI 檢查並讓您的性伴侶也這樣做（對於 STI 的建議可能會因您的住所、性生活史以及跟誰發生性關係而異。有關更多資訊，請參見以下連結 (www.sti.guidelines.org.au)。
- 如果您患有梅毒等 STI，請完成整個治療療程。
- 按照臨床醫生的指示進行後續篩檢。

伴侶通知

要停止傳播，非常重要的一是也必須對性伴侶進行檢測，如果呈陽性，則要同時進行治療。衛生專業人員可以協助您識別並通知性伴侶。

如果您想匿名聯絡您的性伴侶，也可透過以下網站傳送訊息：


- Letthemknow.org.au
(所有人適用)
- Thedramadownunder.info
(針對男同性戀及雙性戀男性及跟男性發生性關係的男性)
- Bettertoknow.org.au
(針對土著居民)。

**請記住，您的性健康很重要，
因此要關注並進行檢測。**



警告

如果您曾經得過梅毒並且沒有治療，體徵及症狀會消失，您可能會覺得很好，但感染會保持在體內（直到治療），並可以傳遞給性伴侶或懷孕期間的胎兒。



有用資訊

阻止 STI-在昆士蘭州針對 15 至 29 歲的性健康運動，提供有關所有 STI、檢測及治療，以及安全性行為的全面資訊。

www.stoptherise.initiatives.qld.gov.au

昆士蘭州的性健康及艾滋病毒服務-提供整個昆士蘭州的性健康及艾滋病毒診所及服務的詳細清單。

www.health.qld.gov.au

FOR ABORIGINAL AND TORRES STRAIT ISLANDER COMMUNITIES:

Young, Deadly, Syphilis Free – Information about syphilis for Aboriginal and Torres Strait Islander people.

www.youngdeadlyfree.org.au

Young, Deadly, Free – Information about all STIs and BBVs for Aboriginal and Torres Strait Islander people.

www.youngdeadlyfree.org.au

Deadly Choices – Empowers Aboriginal and Torres Strait Islander peoples to make health choices for themselves and their families.

www.deadlychoices.com.au

Better to know – Sexual health information and contact tracing for Aboriginal and Torres Strait Islander people.

www.bettertoknow.org.au

對於 LGBTIQ+ 社群：

擁抱青年服務-為 LGBTIQ+ 年輕人及其家庭提供的支援服務。

www.opendoors.net.au

多元化語音-，同齡人提供的電話及網際網路聊天諮詢、推薦及資訊服務。針對所有面對性及／或性別相關問題的人們

www.diversevoices.org.au/services

診所 30-一項免費服務，致力於布里斯本 LGBTIQ+ 社群的心理及性健康。

www.quac.org.au/clinic-30

醫療中心-為布里斯本 LGBTIQ+、性工作者及異性戀社區的整體健康及性健康服務。

www.stonewall.com.au


針對文化及語言多樣化社區：

昆士蘭州種族社區委員會-ECCQ 支援並倡導昆士蘭州文化及語言多樣化社區的需求、利益及貢獻。

www.eccq.com.au

警告

曾經接受過梅毒治療並不能保護一個人(包括懷孕中的未出生嬰兒)再次受到感染。即使經過成功的治療，如果與感染性梅毒患者進行無保護的性接觸，也可能再次感染。



關於梅毒的錯誤觀念與事實

錯誤觀念 #1:梅毒是過去的疾病。

事實#1:

在 2013 年至 2017 年之間,澳洲的傳染性梅毒通報率從 2013 年的每 100,000 人中的 7.8 增加到 2017 年的每 100,000 人中的 18.3,上升了 135%, 男性 (119%) 及女性 (309%) 均有增加(資料來源 Kirby Institute 2018a)。

錯誤觀念 #2:梅毒不能透過口交傳播。

事實 #2:

在陰道、肛門及口腔進行性行為時直接與梅毒瘡接觸可導致梅毒。

錯誤觀念 #3:您會知道自己是否患有梅毒。


事實#3:

跟所有 STI 一樣,梅毒可能沒有症狀,或者您可能不會發現。人們可能會長期患有梅毒,卻一無所知。如果您的性伴侶患有梅毒,可能並不明顯,因為梅毒瘡可以藏在陰道、肛門、陰莖的包皮下或口腔中。

錯誤觀念 #4:梅毒無法治癒。

事實 #4:

完全錯誤的觀念,因為梅毒可以通過抗生素治癒。



我們知道了!

女士們,這就是我要說的,感謝您的閱讀。請記住,要 100% 確定您有沒有 STI,唯一方法就是要求進行檢測。讓我們團結起來成為姐妹,包容並鼓勵您的朋友也這樣做。我們知道了!

Brought to you by:



LADYPEEPS.ORG.AU

#LadyPeeps
#AskAboutSyphilis
#TrueEducation

